


ЛИСТОК-ВКЛАДКА

АГЕПТА®



Дієтична добавка «АГЕПТА®»

Таблетки сублінгвальні.

Містить підсолоджувач.

Склад:

1 таблетка містить:

S-аденозил-L-метіонін дисульфат п-толуолсульфонату — 400 mg (мг) (відповідає 200 mg (мг) катіону адеметіоніну);

допоміжні речовини: наповнювачі: маніт, магнію гідроксид, ксиліт; розпушувач: крохмаль кукурудзяний; протизлежувальний агент: кислота стеаринова; ароматизатор «Мандарин» (носій: мальтодекстрин; емульгатор: гуміарабік; антиоксидант: бутилгідроксіанізол); протизлежувальний агент: кремнію діоксид; зв'язуюча речовина: натрію карбоксиметилцелюлоза; підсолоджувачі: сукралоза, сахарин, неогесперидину дигідрохалькон, адвантам.

Властивості речовин:

S-аденозил-L-метіонін (адеметіонін) — природна сполука, яка утворюється в організмі людини з амінокислоти метіоніну. Адеметіонін бере участь у численних біохімічних процесах, зокрема сприяє збереженню цілісності мембрани клітин печінки, завдяки чому підтримує функцію таких клітин та природні процеси очищення організму.

Рекомендації щодо споживання:

АГЕПТА® рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело адеметіоніну при незбалансованому харчуванні або впливі шкідливих факторів навколишнього середовища.

Сублінгвальна форма адеметіоніну забезпечує зручність вживання (без потреби запивати водою).


Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:

Таблетку слід виймати з блістера безпосередньо перед прийомом.

Приймати дорослим по 1 сублінгвальній таблетці 2 рази на добу за 30-60 хвилин до прийому їжі, розчинити під язиком до повного розсмоктування, не запиваючи водою.

Рекомендований період споживання — до одного місяця. Подальша тривалість споживання визначається індивідуально.

агепта®

**Застереження:**

- Перед споживанням рекомендована консультація фахівця.
- Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Прийом АГЕПТА® перед сном, зокрема на ніч, є небажаним, зважаючи на супутній тонізуючий ефект адеметіоніну.
- У разі одночасного прийому лікарських засобів (зокрема антидепресантів: селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну або трициклічних), інгібіторів моноаміноксидази або засобів, які містять триптофан рекомендована консультація фахівця.
- Не вживати особами з підвищеною збудливістю або психоемоційними порушеннями.
- Не вживати при індивідуальній непереносимості компонентів, під час вагітності або у період годування грудьми.

Форма випуску:

таблетки сублінгвальні №20 (в блістерах по 10 таблеток) в картонній пачці.

Маса нетто 1 таблетки: 2,0 г (г) $\pm$ 5 %.

Строк придатності: 2 роки.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці, за температури від 2 °С до 25 °С.

Виробник:

ФМС с.р.л., Via Aci Consortile, км 0+200, 03013, Ферентіно, Італія.

Імпортер:

ТОВ «ОМНІФАРМА», вул. Мишуги Олександра, буд. 10, прим. 212, м. Київ, 02141, Україна, тел.: +38 (044) 377-51-14.

 **OMNIFARMA**
www.omnifarma.com.ua