



Дієтична добавка ЛАКЛІН®.
Послаблюючий засіб.
Порошок для приготування
орального розчину

- М'яке усунення закрепів
- Підтримка корисної мікробіоти кишечника

Склад: 1 саше містить:

основна речовина: лактитолу моногідрат – 10 g (г); *допоміжна речовина:* кремнію діоксид.

Властивості основної речовини:

Лактитол – похідна дисахариду, яка складається з галактози та сорбітолу. Лактитол надходить до товстого кишечника у незміненому вигляді, там під впливом мікрофлори (переважно *Bacteroides* і *Lactobacilli*) перетворюється, в основному, на органічні кислоти, які знижують рН середовища. Як наслідок, в товстій кишці зростає осмотичний тиск, це веде до збільшення об'єму кишкових мас, стимуляції перистальтики товстої кишки, чим і обумовлений послаблюючий ефект. Зазвичай проносний ефект лактитолу настає протягом 24 годин після прийому.

Крім того, лактитол стимулює зростання ацидофільних бактерій, в той час як зростання потенційно патогенних клостридій і кишкової палички може пригнічуватись. Це сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори.

У людей з печінковою енцефалопатією, прекою або печінковою комою лактитол сприяє переходу аміаку з крові до товстого кишечника (завдяки зниженню рН, збільшенню осмотичного тиску у просвіті кишечника), стимулює утилізацію аміаку бактеріями, видалення з товстої кишки затриманих іонів амонію та інших азотовмісних токсичних речовин.

Рекомендації щодо застосування:

ЛАКЛІН® рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону як додаткове джерело лактитолу з метою:

- усунення закрепів,
- підготовки до медичних процедур і операцій,
- фізіологічного розм'якшення випорожнень і полегшення дефекації при геморої і після операцій на товстому кишечнику і аноректальній зоні,
- сприяння зниженню рівня аміаку.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:

Приймати під час їди. Вміст саше розчинити у теплій воді, соку або змішати з рідкою їжею.

◆ *При закрепах і станах, які вимагають полегшення дефекації.*

Приймати одноразово всю добову дозу відразу, за один прийом, в один і той самий час доби:

- дітям 1-6 років – 2,5-5 g (г) (0,5-1 чайна ложка порошку) на добу;
- дітям 7-12 років – 5-10 g (г) (1-2 чайних ложки порошку) на добу;
- дітям 13-16 років – 10-20 g (г) (2-4 чайних ложки порошку) на добу;
- дорослим – 20 g (г) (4 чайних ложки порошку) на добу.

Прийом дієтичної добавки ЛАКЛІН® має викликати випорожнення кишечника 1 раз на добу; після настання стабільного проносного ефекту протягом декількох днів прийому дозування можна знизити.

В окремих випадках для отримання послаблювального ефекту достатньою буває половина рекомендованої добової дози.

На початку застосування можливе відчуття дискомфорту в животі, метеоризм. Ці явища, як правило, зникають при продовженні прийому, по мірі звикання до лактитолу. Щоб запобігти такому дискомфорту,



Якщо Вам або Вашим близьким необхідно часто або тривалий час приймати цю або інші дієтичні добавки, пропонуємо Вам приєднатись до Клубу споживачів OMNICALUB.

ЗРУЧНІСТЬ & ЕКОНОМІЯ

рекомендовано починати з найменших доз, поступово збільшувати дозу до отримання ефекту. Якщо виникає метеоризм, слід зменшити дозу або припинити застосування.

◆ **Для регуляції дефекації з метою проходження медичних процедур.**

Розвести в 1 л води вміст 2 саше (усього 20 г (г) лактитолу) і прийняти весь обсяг приготованого розчину в 3 прийоми (о 12, 15 та 18 годині) напередодні проведення процедури.

◆ **Для зниження рівня аміаку у дорослих.**

Дозування має бути підібраним індивідуально, в залежності від лабораторних показників та індивідуальної реакції на лактитол. Початкова добова доза зазвичай становить 0,5-0,7 г (г) лактитолу на 1 кг маси тіла. Це дозування розділяють на 3 прийоми під час їжі з метою досягнення 2 «м'яких» дефекацій на добу.

Застереження:

- Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
- Прийом дієтичної добавки ЛАКЛІН® для дітей старших 1 року – за рекомендацією лікаря.
- На підставі рекомендації лікаря допустимий прийом дієтичної добавки ЛАКЛІН® при вагітності і грудному вигодовуванні.
- Лактитол має низьку калорійність, не впливає на рівень глюкози в крові. Тому дієтична добавка ЛАКЛІН® може застосовуватися при цукровому діабеті.
- Дієтичну добавку не слід застосовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Не перевищувати рекомендовану добову дозу! Ознакою передозування є пронос, в окремих випадках – блювота. Ці явища усуваються зниженням разового дозування при приготуванні розчину або припиненням прийому.
- При одночасному прийомі цієї дієтичної добавки з кишковорозчинними препаратами рН-залежного вивільнення слід враховувати, що лактитол знижує рН вмісту кишечника.
- Не рекомендується застосовувати цю дієтичну добавку протягом 2 годин після прийому інших лікарських засобів.
- Прийом дієтичної добавки ЛАКЛІН® вимагає підвищення споживання рідини до 2 л на добу.
- У рідкісних випадках можлива затримка проносного ефекту, коли дія проявиться на 2-3-ю добу прийому.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість лактитолу, галактоземія, непрохідність кишечника, підозра на органічні ушкодження шлунково-кишкового тракту, абдомінальний біль, ректальні кровотечі неясної природи.

Форма випуску: порошок в саше (пакетиках) для приготування орального розчину, по 10 саше в картонній коробці з інструкцією.

Маса нетто 1 саше: 10 г (г) ± 9%.

Термін придатності: 2 роки.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 5 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не вище 75%.

Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМА», Україна,
02141, м. Київ, вул. О. Мишуги, 10, прим. 212,
тел. + 38 044 377-51-14;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:
Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Дударків, вул. Садова, 3.

OMNIFARMA
www.omnifarma.com.ua

ТУ У 10.8-44845904-007:2022

ЗРУЧНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ:

- спеціальні ціни** на економ-упаковки продукції,
- безкоштовна** доставка до Вашого міста,
- інші **корисні** сервіси та **вигідні** пропозиції.

Детальні умови участі у Клубі OMNICLUB та реєстрація:

vipclub.omnifarma.com.ua

**OMNI
CLUB**

Скануйте QR-код, щоб
дізнатись більше

