



**Підтримка нормального випорожнення
та природного балансу мікрофлори**

Дієтична добавка ЛАКЛІН®.

Порошок в саше
для приготування
орального розчину

Склад:

1 саше містить: лактитолу моногідрат – 10 г (г);

допоміжні речовини: наповнювач: мальтодекстрин; протизлежувальний агент: кремнію діоксид.

Властивості речовин:

Лактитол — похідна дисахариду, яка не засвоюється у тонкому кишечнику та досягає товстого кишечника, де ферментується наявною мікрофлорою.

Вживання лактитолу сприяє:

- нормалізації функції кишечника при утрудненому акті дефекації;
 - збільшенню частоти випорожнення;
 - створенню сприятливих умов для росту корисних бактерій (лакто- і біфідобактерій) та підтримці природного балансу мікрофлори кишечника.
- Лактитол має низьку калорійність і не впливає на рівень глюкози в крові, тому може бути рекомендований особам, які контролюють рівень цукру в організмі.

Рекомендації щодо споживання:

ЛАКЛІН® рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело лактитолу.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:

Вживати під час їди. Вміст саше розчинити у теплій воді, соку або змішати з рідкою їжею.

◆ *При станах, які вимагають полегшення дефекації.*

Приймати одноразово всю добову кількість одразу, за один прийом, в один і той самий час доби:

- дітям 1-6 років – 2,5-5 г (0,5-1 чайна ложка порошку) на добу;
- дітям 7-12 років – 5-10 г (1-2 чайних ложки порошку) на добу;
- дітям 13-16 років – 10-20 г (1-2 саше) на добу;
- дорослим – 20 г (2 саше) на добу.

Оптимальна кількість лактитолу визначається індивідуально.

Після досягнення комфортного результату кількість лактитолу можна поступово зменшити.

На початку споживання можливе тимчасове відчуття дискомфорту у животі або підвищене газоутворення. Для зменшення таких проявів рекомендується розпочинати з меншої кількості лактитолу, поступово збільшуючи її до досягнення бажаного ефекту.

У разі появи вираженого дискомфорту слід зменшити кількість або тимчасово припинити споживання.

◆ *Для короткострокового використання з метою очищення кишечника.*

Вміст 2 саше (усього 20 г лактитолу) розчинити в 1 л води та приймати частинами протягом дня.

◆ *Для підтримки природних процесів детоксикації організму.*

Кількість лактитолу визначається індивідуально залежно від особливостей харчування та потреб організму. Початкова добова кількість зазвичай становить 0,5-0,7 г лактитолу на 1 кг маси тіла. Цю добову кількість можна розподілити на декілька прийомів під час їди та вживати для досягнення 2 «м'яких» дефекацій на добу.

Застереження:

- Дієтичну добавку не слід застосовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Перед споживанням рекомендована консультація фахівця.
- Не перевищувати рекомендовану добову кількість, це може спричинити послаблювальний ефект.
- Не вживати при індивідуальній непереносимості компонентів.
- Не вживати дітям першого року життя.
- Для вживання вагітними і жінками, що годують грудьми, потрібна рекомендація фахівця.
- У разі появи дискомфорту або підвищеного газоутворення рекомендується тимчасово зменшити кількість або припинити споживання.
- Не рекомендоване споживання при порушеннях травлення або дискомфорті у животі.

Форма випуску:

порошок в саше (пакетиках) для приготування орального розчину, по 10 саше в картонній коробці.

Маса нетто 1 саше: 14 g (г) $\pm$ 9 %.

Термін придатності: 2 роки.

Умови зберігання:

зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 5 °C до 25 °C та відносній вологості повітря не вище 60 %.

Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМА»,

Україна, 02141, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 10, прим. 212;

тел.: + 38 044 377-51-14;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 08296, Київська область, Бучанський район,

селище Ворзель, вул. Курортна, будинок 54-Б

ТУ У 10.8-44845904-007:2022

 **OMNIFARMA**

www.omnifarma.com.ua