

ЦИНФОРТ®

Для підтримки рівня цинку.

Для підтримки роботи імунної системи.

Для підтримки стану шкіри, волосся, нігтів і зору

Склад: 1 капсула містить: .

цинку бісгліцинату – 90,3 mg (mg) (відповідає 25 mg (mg) елементарного цинку);

допоміжні речовини: наповнювачі: целюлоза мікрокристалічна, лактоза; проти-злежувальні агенти: кальцію стеарат, кремнію діоксид; оболонка капсули: желатин, титану діоксид.

% від добової потреби дорослого населення*:

1 капсула	жінки	чоловіки
цинк	208%	167%

Властивості речовин:

Цинк є одним із мікроелементів, які беруть участь у численних обмінних процесах організму. Зокрема вживання цинку сприяє:

- нормальному вуглеводному метаболізму;
- нормальному метаболізму жирних кислот, вітаміну А;
- нормальному синтезу протейну;
- нормальному засвоєнню макронутрієнтів;
- нормальній когнітивній функції мозку;
- нормальному синтезу ДНК;
- нормальним здатності до запліднення та репродуктивній функції;
- підтриманню нормального стану кісток;
- підтриманню нормального стану волосся, нігтів, шкіри;
- підтриманню нормального зору;
- нормальній роботі імунної системи;
- захисту клітин від оксидативного стресу;
- процесу поділу клітин.

Погіршення засвоюваності цинку можливе за умови надмірного споживання:

- продуктів, що містять значну кількість фітинової кислоти (каші, висівки, насіння, горіхи, бобові, клітковина);
- мінералів, які можуть конкурувати з цинком за засвоєння в кишечнику, таких як кальцій та залізо.

Застосування бісгліцинату цинку забезпечує високий рівень засвоєння елементу в організмі.

Рекомендації щодо споживання:

ЦИНФОРТ® рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело цинку для забезпечення його достатнього рівня в організмі, особливо при незбалансованому харчуванні або підвищеній потребі у цинку.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:

Вживати дорослим по 1 капсулі на добу. Тривалість споживання визначається індивідуально.

Для кращого засвоєння цинку ЦИНФОРТ® бажано приймати за 1 годину до їди або через 2 години після їди.

При виникненні неприємного відчуття з боку шлунку або кишківника ЦИНФОРТ® слід приймати безпосередньо до або протягом споживання їжі.

У періоди сезонного зниження опірності організму доцільно вживати курсом протягом 1–2 місяців поспіль з перервою на 10 днів. Може поєднуватися з іншими дієтичними добавками, що містять вітамін D.

Застереження:

- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
- Слід уникати одночасного вживання цієї дієтичної добавки та комплексних вітамінних засобів, які містять цинк.
- Перевищення рекомендованої добової кількості цинку може спричинити дефіцит міді. Надмірна кількість цинку може спричинити нудоту, блювання, гіпотонію (запаморочення), втрату апетиту, спазми в животі, біль у ротовій порожнині та горлі, діарею та головний біль. У випадку названих симптомів слід звернутись до фахівця.
- Не вживати при індивідуальній непереносимості компонентів, в періоди вагітності та годування груддю, при непереносимості галактози або фруктози, дефіциті лактази, синдромі мальабсорбції галактози

Форма випуску: капсули №20, по 10 капсул у блістері, в картонній пачці.

Маса нетто 1 капсули: 320 mg (mg) $\pm$ 5 %.

Строк придатності: 2 роки.

Умови зберігання: при температурі не вище 25 °C, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМА»,

Україна, 02141, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, буд. 10, прим. 212;

тел.: + 38 044 377-51-14;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 61004, м. Харків, вул. Конєва, 21.

ТУ У 10.8-44845904-016:2022

*Наказ МОЗ України № 1073 від 03.09.2017 р